

ЛИСТОВКА ЗА:

ГЛЮКОКАЛЦИН® инжекционен разтвор за крави

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

ВЕТПРОМ АД, гр.Радомир, ул."Отец Паисий" 26

тел.: 0777/8-24-93, 8-00-19; факс: 0777/8-23-91

E-mail: vetprom@abv.bg

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ГЛЮКОКАЛЦИН® инжекционен разтвор

GLUCOCALCIN® solutio pro injectionibus

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активни субстанции:

Calcium chloride Hexahydrate 5.0 g/100 ml

Glucose Monohydrate 20.0 g/100 ml

Ексципиент:

Water for injections до 100 ml

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При хипокалцемия, остеомалация, хипокалцемична тетания, при родилна пареза; при септицемии, токсемии; при фуражни интоксикации; при мозъчно възпаление; при изтощителни диарии; при уртикария и серумна болест; при петехиална треска, пуерперална кома; при възпаление на матката; при бронхити, пневмонии; за предотвратяване на белодробен оток; при нефрити, неврози, менингити, пододерматити и др.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при дистрофични увреждания на черния дроб при високопродуктивни крави.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

При попадане на разтвора извън вената се развива некроза на тъканите – предотвратява се с инжектиране в тъканите на 10%-ов разтвор на натриев сулфат.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Крави.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Само за интравенозно приложение.

250 ml 1-2 пъти дневно.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Само за интравенозно приложение.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: Нула дни.

Мляко: Нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 28 дни. Да се съхранява в хладилник (2 С–8 С).

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

При едновременното прилагане на Калциев хлорид и калиеви добавки се увеличава вероятността от развитие на аритмии. Витамин А може да предизвика извличането на калций от костите и повишаване на нивото му в кръвта. Витамин Д може да увеличи абсорбцията на калция и да предизвика хиперкалцемию. Калцият може да продиводействува на Верапамила. При парентерално приложение, калцият може да неутрализира действието на мангана при отравяне. Калцият може да понижи ефекта на Метубин, Галамин и др. миорелаксанти. Калцият пролонгира или усилва действието на Тубокурарина.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Хиперкалцемия може да възникне при едновременно прилагане на продукта и Витамин Д.

При нормална бъбречна функция, отстраняването на калция от организма става бързо и лесно.

При по-тежките форми на хиперкалцемия отстраняването става с приемането на физиологичен разтвор и диуретици /фуросемид/.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

04/03/2013