

ЛИСТОВКА ЗА:

ГЛЮКОКОФЕИН® инжекционен разтвор

GLUCOCOFEIN® solutio pro injectionibus

Инжекционен разтвор за говеда, коне, овце, кози и кучета

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

ВЕТПРОМ АД, 2400 гр. Радомир, България, ул. “Отец Паисий” № 26

тел.: 0777/8-24-93, 8-02-68; факс: 0777/8-23-91

E-mail: vetprom@abv.bg

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ГЛЮКОКОФЕИН® инжекционен разтвор

GLUCOCOFEIN® solutio pro injectionibus

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активни субстанции:

Glucose Monohydrate 20.0 g/100 ml

Caffeine Sodium Benzoate 0.8 g/100 ml

Ексципиенти:

Water for injections

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При инфекциозни и неинфекциозни заболявания, фуражни интоксикации, при отравяния с вещества подтискащи ЦНС, при остри сърдечно-съдови разстройства, при и след прекарани тежки заболявания, състояние на треска, слабост, изтощение, при родилна пареза при крави, следродилен сепсис, при отоци и възпаления в областта на главния и гръбначния мозък и техните обвивки и на копитата.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.

Остри миодегенерации на сърдечния мускул, некомпенсирани пороци; хипергликемия.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

При висока скорост на инфузията е възможна е поява на повишена възбудимост, тахикардия и аритмия, повишена възбудимост, мускулен тремор и засилена диуреза.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)
- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, коне, овце, кози и кучета.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Доза:

За говеда и коне - 200-300 ml 1-2 пъти дневно; за овце и кози - по 50 ml 1-2 пъти дневно; за кучета - по 10-30 ml 1-2 пъти дневно.

Начин на прилагане:

Интравенозно (бавно).

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Винаги използвайте ГЛЮКОКОФЕИН инжекционен разтвор съгласно инструкциите на Вашия ветеринарен лекар.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни. Да се съхранява в хладилник (2 °С – 8 °С).

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

При съвместно прилагане на кофеинсъдържащи продукти и бромиди в подходящи дози, може да се постигне балансиране между възбудните и задръжните процеси (ако съотношението между тях е било нарушено) и да се лекуват неврози и кортико-висцерални заболявания (бром-кофеинова терапия). При едновременното прилагане на продукта със сънотворни – намалява тяхното действие; с нестероидни противовъзпалителни средства – засилва ефекта им.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:

При употреба на по-високи дози процесите на възбуждане ирадират, което може да се изрази в ускорена реакция при дразнене, в моторна възбуда, безпокойство и безсъние. Това влияние на кофеина се сменя след това със затормозяване, с намалена функционална дейност (зад пределно задържане). В големи дози кофеинът предизвиква хипергликемия и глюкозурия, поради увеличено отделяне на адреналин. Наблюдават се гърчове, треперене на мускулатурата.

Мерки при предозиране: При поява на такава клинична картина се преустановява инфузията и се прилага симптоматично лечение.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

24/02/2015

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба:

ВЕТПРОМ АД, 2400 гр. Радомир, България, ул. „Отец Паисий” №26,

тел.: 0777/8-24-93, 8-00-19; факс: 0777/8-23-91,

E-mail: vetprom@abv.bg