

ЛИСТОВКА ЗА:

ИХТАМОЛ ВЕТПРОМ 10% маз

ICHTHAMMOL VETPROM 10% ointment

Говеда, коне, магарета, свине, овце, кози и кучета.

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

ВЕТПРОМ АД, 2400 гр. Радомир, България, ул. "Отец Паисий" № 26

тел.: 0777/8-24-93, 8-02-68; факс: 0777/8-23-91

E-mail: vetprom@abv.bg

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ИХТАМОЛ ВЕТПРОМ 10% маз

ICHTHAMMOL VETPROM 10% ointment

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

В 50 g се съдържат:

Активна субстанция: Ichthammol 5.0 g

Ексципиенти: Adeps Suillus, White Soft Paraffin

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При повърхностни и по-дълбоки гнойни възпалителни заболявания на кожата и подкожната съединителна тъкан-фурункули, карбункули, флегмони, абсцеси, язви, фистули, гнойни рани, екземи, гнойни дерматити, изгаряния, измръзвания. При заболявания на опорно-двигателния апарат, като гнойни бурзити и тендовагинити, остеомиелити след остеосинтеза и др.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите

Да не се използва при животни от сем. Котки.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Възможна е появата на кожни обриви.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)
- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, коне, магарета, свине, овце, кози и кучета.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Външно.

Предварително почистена, засегнатата зона се намазва добре с мазта /посредством шпатула/ 1-2 пъти дневно.

Прилага се до затихване на възпалителния процес, болката и изчистването на раните.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Няма.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30 дни. Да се съхранява при температура под 25 °С. Да се пази от светлина. Да се съхранява на сухо място.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Несъвместим е с йод, тежки метали и алкалоиди.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

15/01/2015

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.