

ЛИСТОВКА ЗА:

ЙОДОФАРМ® - пенообразуващ аерозол за вътрематочно приложение за крави, биволици и кобили.

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

ВЕТПРОМ АД, гр.Радомир, ул."Отец Паисий" 26

тел.: 0777/8-24-93, 8-00-19; факс: 0777/8-23-91

E-mail: vetprom@abv.bg

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ЙОДОФАРМ® - пенообразуващ аерозол за вътрематочно приложение

JODOPHARM® - aerosolum spumiferum intrauterinicum

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активни субстанции:

Iodine 0.18 g/40 g

Potassium iodide 0.36 g/40 g

Ексципиенти:

Polavax A-31

Dimethyl Sulphoxide

Ethanol (96 per cent)

Propylene Glycol

Forane 134 A

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При хронични ендометрити от първа до трета степен; при пиометра.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Продуктът предизвиква хиперемия, каквато предизвикват и другите лекарствени форми, съдържащи йод.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Крави, биволици и кобили.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Съдържанието на един моноблок отговаря на една доза. В повечето случаи е достатъчно еднократно третиране. При по-тежки увреждания третирането може да се повтори дву- или трикратно през 7-дневни интервали. При пиометра може да се впръска съдържанието на два моноблока като еднократна доза.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Вътрематочно приложение, след предварително изследване и масаж на матката през ректума. Според установения начин с едната ръка се фиксира цервикса, а с другата - наконечника. Посредством натискане на бутона, който е съединен с тубата, за 10-15 s се впръсква съдържанието на моноблока. В случай на пиометра лекарствения продукт се прилага след предварително изтегляне на гнойната материя от матката.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: Нула дни.

Мляко: Нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от удар и нагряване над 45 °С!

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Присъствието на органични вещества намалява антибактерийното му действие.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

04/03/2013

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.