

## ЛИСТОВКА ЗА:

**Витамин АД<sub>3</sub>Е инжекционен разтвор**

**Vitamin AD<sub>3</sub>E solutio pro injectionibus**

Инжекционен разтвор за говеда, овце, кози, коне, свине и прасета.

### **1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ**

ВЕТПРОМ АД, 2400 гр. Радомир, България, ул. "Отец Паисий" № 26

тел.: 0777/8-24-93, 8-02-68; факс: 0777/8-23-91

E-mail: vetprom@abv.bg

### **2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ**

Витамин АД<sub>3</sub>Е инжекционен разтвор

Vitamin AD<sub>3</sub>E solutio pro injectionibus

### **3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ**

#### **Активни субстанции:**

Vitamin A 1 500 000 IU/100 ml

Cholecalciferol (Vitamin D<sub>3</sub>) 2 000 000IU/100 ml

Alpha Tocopheryl Acetate (Vitamin E) 1.0g/100 ml

#### **Ексципиенти:**

Chlorocresol, Sunflower Oil

### **4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

При А-, Д- и Е-хиповитаминозни състояния; при гастроинтестинални и белодробни заболявания; при мускулна дистрофия при агнета и телета; при смущение в спермиогенезата при разплодници; за повишаване на резистентността при младите животни при инфекциозни и инвазионни болести; при остеоомалация.

## 5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.

Да не се използва при животни за които не е предназначен.

## 6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

При интрамускулно приложение може да се появи временна болка в мястото на инжектиране.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)
- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

## 7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, овце, кози, коне, свине и прасета.

## 8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Интрамускулно, подкожно или перорално приложение.

Вид животни	Интрамускулно или	Перорално (капки),
	подкожно, в ml	в броя
Говеда, биволи и коне	3 – 5	10 – 12
Телета, кончета и малачета	0.5 – 1	3 – 5
Овце и кози	1 – 1.5	2 – 4
Свине	1 – 2	3 – 6
Прасета	0.25 – 0.5	1 – 3

Дозите могат да бъдат увеличени до 3 пъти с терапевтична цел.

С профилактична цел продуктът се прилага парентерално еднократно, а при нужда повторно – след 1 седмица.

## 9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Винаги използвайте Витамин АД<sub>3</sub>Е инжекционен разтвор съгласно инструкциите на Вашия ветеринарен лекар.  
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

## **10. КАРЕНТЕН СРОК**

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула дни.

## **11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °С

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни. Да се съхранява в хладилник (2 °С – 8 °С).

## **12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

### Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Присъствието на ненаситени мастни киселини намаляват резорбцията на витамин А и Д<sub>3</sub>. Витамин Е може да усилва абсорбцията на витамин А. Големи дози от витамин Е намаляват действието на желязото при животни с анемия. Минералното масло може да понижи абсорбцията на перорално приложен витамин Е.

### Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

При предозиране може да се появи безпокойство, липса на апетит, повръщане.

**Мерки при предозиране:** Лечението се спира и се прилага симптоматично лечение.

## **13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

## **14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА**

31/05/2014

## **15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба:

ВЕТПРОМ АД, 2400 гр. Радомир, България, ул. „Отец Паисий“ №26,

тел.: 0777/8-24-93, 8-00-19; факс: 0777/8-23-91,

E-mail: [vetprom@abv.bg](mailto:vetprom@abv.bg)