

Упътване за употреба

VITAMIN B₁ 2%
solutio pro injectionibus

ВИТАМИН В₁ 2%
разтвор за инъекции

Само за ветеринарномедицинска употреба

Име и адрес на управление на притежателя на лиценз за употреба: ВЕТПРОМ АД, България, гр.Радомир, ул. Отец Паисий №26

Витамин В₁ съдържание на активното вещество в 1 ml - 0.02 g Витамин В₁(Thiamine Hydrochloride).

Терапевтични показания: При хипо- и авитаминоза В₁ /бери-бери/; при отравяния с орлова папрат /Pteridium aquilinum/ и с хвощ /Equisetum arvense/, със сулфаниламиди, с арсенови и оловни съединения; при периферни парализи, при неврити и невралгии; при сърдечни и чернодробни увреждания; при атопия на предстомашията и на тънките черва; при дерматити; като спомагателен препарат при заразни заболявания; при вътрешно прилагане на сулфаниламиди, нитрофуранови съединения и антибиотици; при хранене с фураж, богат на въглехидрати.

Противопоказания за употреба: Лекарственият продукт е противопоказан при животни, имащи повишена чувствителност към Витамин В₁(Thiamine Hydrochloride).

Странични реакции: Възможна е появата на болезнена чувствителност на мястото на инжектиране.

Лекарствени или други форми на взаимодействие: Витамин В₁(Thiamine Hydrochloride) може да усилва действието на нервни-мускулните блокатори. Не се препоръчва едновременното прилагане в една спринцовка или инфузионен разтвор на Витамин В₁ с Витамин В₁₂, поради прякото разграждащо витамините действие на кобалта, съдържащ се във Витамин В₁₂.

Видове животни, за които е предназначен ВМП, доза за всеки вид животно и начин на прилагане:

Животни: едри и дребни преживни животни, свине, котки, кучета, птици.

Начин на прилагане: подкожно, мускулно и венозно.

Доза: говеда и биволи по 5-15-25ml;

телета - по 0.5ml;

коне - по 0.5-1-2.5-5ml;

дребни преживни - по 0.5-2.5ml;

свине - по 0.75-1.5-3ml;

котки - по 0.1-0.25ml ;

кучета - по 0.1-1ml;

птици - до 0.1-0.2ml .

Предозиране: При предозиране, особено при венозно вкарване може да предизвика шокови явления ("тиаминов шок"). При въвеждане на много високи дози (LD₅₀ е 350 mg/ml) се наблюдава нервномускулна блокада при животните; хипотензия и учестено дишане.

Мерки при предозиране: Лечението е симптоматично.

Карентен срок: Няма.

Специални предпазни мерки при съхранение на продукта: Не се изискват.

Съхранение: При стайна температура (15-25°C), на сухо и защитено от светлина място.

Да се съхранява на недостъпни за деца места!

Допълнителни данни за безопасност и защита здравето на хората, които работят с ВМП, специални предпазни мерки и предупреждения: Не се изискват.

Специални предпазни мерки при унищожаване на неизползвания ВМП или остатъците от него: съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на последна редакция на листовката: януари 2008 г.