

ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
ВИТАМИН В₁₂ разтвор за инжекции 500 γ
5 ml
VITAMIN B₁₂ solutio pro injectionibus 500 γ
5 ml

За едри и дребни преживни животни, прасета, свине, кучета и кокошки

ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител:

ВЕТПРОМ АД, България, гр.Радомир, ул. Отец Паисий №26

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ВИТАМИН В₁₂ разтвор за инжекции 500 γ / VITAMIN B₁₂ solutio pro injectionibus 500 γ

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

В 5 ml лекарствен продукт се съдържат като активно вещество 0.0005 g Суанособаламин и като помощни вещества Sodium Chloride и Water for Injections.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При хиперхромни, макроцитерни и хипопластични анемии; при вторични анемии, вследствие на бременност, хелминтози, хемоспориозози; при интоксикации с тежки метали, бензолни продукти и хлорорганични инсектициди; за терапия и профилактика на дегенерация на черния дроб, при неврити, миелити, невралгии; при лъчева болест; при фуражни отравяния; за подобряване на храносмилането; като стимулиращо растежа средство при подрастващите животни- за повишено използване на храната; при закържавели животни.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или някое от помощните вещества!

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

Не са известни.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

За едри и дребни преживни животни, прасета, свине, кучета и кокошки

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Доза: Средна доза 2 γ/kg:

за говеда и биволи - по 500 γ-0.001 /5-10 ml от 0.01 % разтвор/;

за телета и малачета - по 150-200 γ /1.5-2 ml от 0.01 % разтвор/;

за овце, кози и свине - по 100-300 γ /1-3 ml от 0.01 % разтвор/;

за прасета - по 10-50 γ /0.5-2.5 ml от 0.002 % разтвор/;

за кучета - по 15-30 γ /0.75-1.5 ml от 0.002 % разтвор/;

за кокошки - по 2-5 γ /0.1-0.25 ml от 0.002 % разтвор/.

При тежки възпалителни заболявания на едрите животни може да се инжектират до 0.1-0.2, понякога 0.3-0.5, а на свинете до 500 γ с оглед за антиалергично и антифлогистично действие.

Начин на прилагане:

Мускулно и подкожно.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Винаги използвайте ВИТАМИН В₁₂ разтвор за инжекции точно както Ви е казал Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

КАРЕНТЕН СРОК

Не се изисква.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява при температура под <25°C, на сухо и защитено от светлина място.

Да се съхранява на недостъпни за деца места!

Срок на годност след първо отваряне на опаковката- 28 дни, съхранение при хладилни условия при температура +2 до +8°C.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)

Няма.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Август 2010 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

ВЕТПРОМ АД,

2400 гр. Радомир, България, ул. "Отец Паисий" № 26, тел.: 0777/8-24-93, 8-00-19; факс: 0777/8-23-91,

E-mail: vetprom@abv.bg